

## IATROGENIILE

Definiție: stări somato-psihiice negative determinate de grșeli în exercitarea actului terapeutic

Tipuri:

- Iatrogenia medicamentoasă:
  - Se datorează indicării greșite a medicamentelor
  - Situații mai frecvente:
    - Neadaptarea dozelor la particularitățile biologice ale cazului:
      - la copii calcularea dozelor în funcție de greutatea corporală
      - la vârstnici reducerea dozelor (înjumătățire)
      - la pacienții cu insuficiență renală:
      - la pacienții cu insuficiență hepatică
    - Neinvestigarea anamnezică și uneori paraclinică a alergiei medicamentoase anterior inițierii unui tratament
- Iatrogenia de comunicare:
  - Se datorează erorilor de comunicare cu pacientul
    - Erori cantitative – în care volumul informațiilor transmise este inadecvat
      - Variante:
        - Comunicarea insuficientă – pacientul are senzația că
          - i se ascunde ceva pentru că are o boală gravă
          - medicul nu îi acordă suficientă atenție
        - Comunicarea excesivă
          - datorită incapacității de selectare a informațiilor esențiale legate de managementul bolii, pacientul poate reține o serie de date irelevante în detrimentul unora esențiale
      - Erori calitative – în care modul de transmitere al informațiilor este inadecvat
        - Situația cel mai frecvent întâlnită este abundența termenilor de specialitate
  - Iatrogenia de investigație
    - Se datorează:
      - Indicării nejustificate a examinărilor paraclinice
        - Pacienții, mai ales cei internați, solicită în permanență să fie investigați

- Investigațiile paraclinice sunt:
  - invazive – presupun riscuri sau determină un disconfort semnificativ pacientului:
    - puncția venoasă
    - examinările radiografice, inclusiv tomografia computerizată
    - gastroscopia
    - colonoscopia
  - neinvazive – nu presupun riscuri și nu determină un disconfort semnificativ pacientului:
    - ecografia
    - electrocardiograma
    - rezonanța magnetică nucleară
- Efectuării propriu-zise greșite ale examinărilor paraclinice
- Iatrogenia de spital
  - Se datorează:
    - Ideii greșite că întotdeauna internarea se indică în cazul bolilor grave
    - Pierderii intimității pacienților internați prin recolateră anamnezei și a examenului obiectiv în salon, alături de alți pacienți
    - Nevoii de conviețuire cu persoane în realitate necunoscute, cu anumite particularități
      - persoane prea vorbărețe
      - persoane care forăie
      - persoane care mănâncă în timpul nopții
      - persoane care ascultă radioul sau se uită la TV în salon
    - Programului incomod de spital:
      - orarul de somn (stingerea la 21:00 iar deșteptarea la 6:30)
      - orarul meselor (mic dejun 9:00, prânz 12:30, cină 17:30)
    - Condițiile hoteliere