

IATROGENIILE

Definiție: stări somato-psihiice negative determinate de grșeli în exercitarea actului terapeutic

Tipuri:

- Iatrogenia medicamentoasă:
 - Se datorează indicării greșite a medicamentelor
 - Situații mai frecvente:
 - Neadaptarea dozelor la particularitățile biologice ale cazului:
 - la copii calcularea dozelor în funcție de greutatea corporală
 - la vârstnici reducerea dozelor (înjumătățire)
 - la pacienții cu insuficiență renală:
 - adaptarea dozelor în funcție de clereance creatinină
 - la cei dializați adaptarea dozelor în funcție de proporția de eliminare prin dializă a medicamentului
 - la pacienții cu insuficiență hepatică
 - indicarea unor medicamente care nu sunt metabolizate la nivel hepatic
 - reducerea dozelor la medicamentele cu metabolizare hepatică
 - Neprecizarea duratei tratamentului:
 - întrerupere prematură a tratamentului
 - prelungirea tratamentului cu posibilitatea inducerii dependenței medicamentoase (la unele medicamente psihotrope)
 - Neprecizarea modului de întrerupere a tratamentului
 - unele medicamente, în cazul întreruperii bruște a tratamentului determină un „efect de rebound” (reinstalarea simptomelor anterioare adesea la o intensitate mai crescută decât cea inițială):
 - o serie de medicamente psihotrope
 - medicamentele antihipertensive
 - Neinvestigarea anamnestică și uneori paraclinică a alergiei medicamentoase anterior inițierii unui tratament
- Iatrogenia de comunicare:
 - Se datorează erorilor de comunicare cu pacientul
 - Erori cantitative – în care volumul informațiilor transmise este inadecvat

- Variante:
 - Comunicarea insuficientă – pacientul are senzația că
 - i se ascunde ceva pentru că are o boală gravă
 - medicul nu îi acordă suficientă atenție
 - Comunicarea excesivă
 - datorită incapacității de selectare a informațiilor esențiale legate de managementul bolii, pacientul poate reține o serie de date irelevante în detrimentul unora esențiale
 - Erori calitative – în care modul de transmitere al informațiilor este inadecvat
 - Situația cel mai frecvent întâlnită este abundența termenilor de specialitate
- Iatrogenia de investigație
 - Se datorează:
 - Indicării nejustificate a examinărilor paraclinice
 - Pacienții, mai ales cei internați, solicită în permanență să fie investigați
 - Investigațiile paraclinice sunt:
 - invazive – presupun riscuri sau determină un disconfort semnificativ pacientului:
 - puncția venoasă
 - examinările radiografice, inclusiv tomografia computerizată
 - gastroscopia
 - colonoscopia
 - neinvazive – nu presupun riscuri și nu determină un disconfort semnificativ pacientului:
 - ecografia
 - electrocardiograma
 - rezonanța magnetică nucleară
 - Efectuării propriu-zise greșite ale examinărilor paraclinice
 - Iatrogenia de spital
 - Se datorează:
 - Ideii greșite că întotdeauna internarea se indică în cazul bolilor grave
 - Pierderii intimității pacienților internați prin recoltarea anamnezei și a examenului obiectiv în salon, alături de alți pacienți

- Nevoii de conviețuire cu persoane în realitate necunoscute, cu anumite particularități
 - persoane prea vorbărețe
 - persoane care forăie
 - persoane care manâncă în timpul nopții
 - persoane care ascultă radioul sau se uită la TV în salon
- Programului incomod de spital:
 - orarul de somn (stingerea la 21:00 iar deșteptarea la 6:30)
 - orarul meselor (mic dejun 9:00, prânz 12:30, cină 17:30)
- Condițiile hoteliere